

# Ongedierte

die kunnen voorkomen in mout en graan



**Broodkever**  
*Stegobium paniceum*

roodbruin  
2-4 mm lang  
ovaal van vorm  
heeft ver uitstekende antennes



**Gehoornde meelkever**  
*Gnatocerus cornutus*

kastanjebruin  
4-6 mm lang  
het mannetje heeft twee uitgegroeide  
kaken, die lijken op hoorns



**Getande graankever**  
*Oryzaephilus surinamensis*

donkerrood tot bruin  
2,5-3,5 mm lang  
6 zaagvormige uitsteeksels aan beide  
zijden van het borststuk




**Graanklander**  
*Sitophilus granarius*

bruin tot zwart  
3-5 mm lang  
heeft knotsvormige, geknikte  
antennen  
een "olifantssnuit"



**Kleine graanboorder**  
*Rhizopertha dominica*

roodbruin tot zwartbruin  
3 mm lang  
de kop is verborgen onder het halsschild  
(monnikskap)



**Graanpalpenmot**  
*Sitotroga cerealella*

13-19 mm spanwijdte  
6-9 mm lang  
voorvleugels zijn gelig tot geelbruin  
de achtervleugels zijn grijs  
de achterste randen van de voor- en  
achtervleugels hebben lange franjes  
zeldzaam!



**Grauwe meelmot**  
*Ephestia kuehniella*

20-25 mm spanwijdte  
7-9 mm lang  
voorvleugels zijn grijs tot zwartgrijs  
achtervleugels geelwit  
schaars!



De afbeeldingen zijn ter verduidelijking vergroot en ook niet in verhouding met elkaar. Lees de bijhorende beschrijving voor meer informatie over hun ware grootte. Meer informatie te vinden op: <http://www.brouw-bier.nl/>